


Nota lanjut

Kami telah cuba untuk memberikan maklumat yang lengkap, tepat dan maklumat terkini dalam risalah ini pada bukti dan pendapat perubahan semasa. Walau bagaimanapun, maklumat dan nasihat mungkin berbeza-beza dari sumber-sumber yang berbeza mengikut masa. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, sila berjumpa dengan doktor anda atau penasihat kesihatan anda.

Lokasi Kami



Klinik DSC

31 Kelantan Lane #01-16 S(200031)

Perkhidmatan Bas

23, 64, 65, 66, 67, 130, 139, 147, 147A, 857

Stesen MRT terdekat

Bugis (EWL/DTL)
Rochor (DTL)
Lavender (EWL/DTL)
Farrer Park (DTL)

HIV / STI maklumat berekod
6295 2944

HIV / STI Hotline
1800 - 2521324 (Pada waktu pejabat)

Buat temujanji bersama kami

Hubungi pusat temujanji di talian 6293 9648
atau email di apptdsc@nsc.com.sg

UNTUK MENGETAHUI INFORMASI KLINIK LEBIH LANJUT SILA LAWATI WWW.DSC-CLINIC.SG
ATAU DI FACEBOOK KAMI DI WWW.FACEBOOK.COM/DSCSG

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM (Malay)

Apakah itu Molluscum Contagiosum?

Molluscum adalah jangkitan kulit yang disebabkan oleh Molluscum Contagiosum virus.

Bagaimana Molluscum Contagiosum boleh dijangkiti?

Molluscum boleh berjangkit daripada orang yang dijangkiti melalui sentuhan kulit seksual atau bukan seksual.

Jangkitan melalui seks sering menyebabkan molluscum untuk muncul di kulit berhampiran dengan kawasan kemaluan manakala jangkitan bukan seksual biasanya menyebabkan luka-luka di muka, lengan dan tubuh badan.

Jangkitan ini kadang-kadang boleh berlaku dari objek seperti tuala mandi, span, dan perkara-perkara yang menyebabkan luka kulit (contohnya pisau cukur). Elakkan berkongsi tuala dan peralatan kebersihan diri apabila anda mempunyai jangkitan. Bercukur dan lain-lain prosedur penyingkiran rambut di kawasan yang terjejas juga perlu dielakkan untuk mengelakkan molluscum meluas pada badan.

Anda mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mendapat molluscum dan jangkitan kelamin yang lain jika anda mempunyai ramai pasangan seks atau hubungan seks dengan pekerja seks.

Apakah tanda-tanda dan gejala-gejala?

- Mungkin tiada gejala. Kecil, ketulan daging berwarna mungkin muncul pada kulit, 2 minggu hingga 6 bulan selepas pendedahan
- Ketulan boleh muncul pada alat kelamin, paha, punggung dan kawasan kemaluan, dan kadang-kadang di sekitar dubur

- Jika anda mempunyai imuniti yang rendah, mereka cenderung untuk menjadi lebih meluas
- Sesetengah orang yang dijangkiti molluscum akan menyebabkan kulit yang ruam sekitar ketulan.

Siapakah yang harus mendapatkan ujian?

Anda mungkin mahu untuk mendapatkan ujian jika anda mempunyai lebam yang luar biasa atau lepuh yang tidak hilang dalam masa beberapa hari, atau jika pasangan seksual anda mempunyai tanda-tanda dan gejala molluscum.

Bagaimana Molluscum Contagiosum didiagnosis?

Doktor atau jururawat akan memeriksa kulit anda. Mereka boleh melaksanakan ujian ke atas sampel kecil yang diambil dari ketulan untuk mengesahkan diagnosis.

Hasilnya boleh diketahui pada hari yang sama lawatan ke klinik DSC.

Bolehkah Molluscum Contagiosum dirawat?

Molluscum biasanya hilang dalam tempoh 6-12 bulan (boleh sehingga 4 tahun) tanpa rawatan. Ia tidak menyebabkan komplikasi serius tetapi ketulan boleh menjadi buruk.

Rawatan boleh mempercepatkan proses tetapi boleh menyebabkan rasa kurang selesa dan menyebabkan parut.

Jenis rawatan termasuk:

- Pembekuan
- Mengikis ketulan
- Memerah teras dari setiap ketulan

- Krim atau losyen yang ditetapkan rawatan berulang mungkin diperlukan sebelum semua ketulan hilang. Ketulan baru mungkin muncul lagi.

Ia boleh menjadi lebih sukar untuk merawat Molluscum jika anda HIV positif.

Molluscum Contagiosum semasa hamil

Maklumkan pada doktor anda jika anda hamil atau memberi susu badan kerana ia mungkin mempengaruhi jenis rawatan yang akan diberikan oleh doktor anda.

Adakah saya perlu kembali untuk lawatan susulan?

Doktor anda akan menasihatkan anda dengan sewajarnya. Anda mungkin perlu kembali ke klinik untuk pemeriksaan jika anda mempunyai jangkitan seksual lain dan HIV, terutamanya jika anda mempunyai sebarang hubungan seks tanpa perlindungan dalam 3 bulan lepas.

Nota Penting

Menggalakkan pasangan seksual anda untuk datang untuk pemeriksaan. Kedua-dua anda dan pasangan anda boleh mendapat manfaat daripada pemeriksaan untuk jangkitan kelamin yang lain dan HIV.

Kurangkan peluang anda untuk menyebarkan jangkitan dengan mengelakkan seks jika anda mendapati mana-mana ketulan. Kondom tidak boleh menghentikan molluscum daripada disebarkan kerana ia tidak boleh meliputi semua kawasan kulit yang terjejas.