

地点



DSC 诊所

31 Kelantan Lane #01-16 S(200031)

巴士服务

23, 64, 65, 66, 67, 130, 139, 147, 857

最靠近的地铁站

武吉士 (东西线 / 市区线)	劳明达 (东西线)
花拉公园 (东北线)	梧槽 (市区线)
惹兰勿剎 (市区线)	

爱之病/性病录音资讯线
6295 2944

爱之病/性病热线
1800 - 2521324 (办公时间)

与我们预约

请拨打
6293 9648 预约中心
或电邮至
apptdsc@nsc.com.sg 预约

更多诊所资料请查阅网址 WWW.DSC-CLINIC.SG
或上我们的脸书 WWW.FACEBOOK.COM/DSCSG

淋病 GONORRHOEA

什么是淋病?

淋病是一种由细菌引起、通过性接触传染的疾病，男女皆有患病的可能。

淋病感染如何传播?

- 与淋病患者进行性行为（包括口交、阴交或肛交）
- 母婴传播（患病孕妇在分娩过程中传染给胎儿）

淋病感染有哪些症状?

患者在染上淋病可能不会呈现任何症状，如有，则可能包括以下症状：

男士	妇女
<ul style="list-style-type: none"> • 生殖器排出白色或黄色分泌物 • 排尿时疼痛或不适 • 肛门排出分泌物 (肛交者) 	<ul style="list-style-type: none"> • 阴道排出白色或黄色分泌物 • 排尿时有灼痛感 • 异常阴道出血 • 肛门排出分泌物 (肛交者)

新生儿

新生儿通过分娩过程中感染，可能引起淋菌性眼炎而导致失明。

淋病感染的症状何时出现?

淋病患者通常会在感染的第2至7天后（或更久）才会出现症状。多数患有咽喉或肛门淋病的患者是不会有症状。女性患者一般也不会有任何症状，因此容易被忽视。

哪些人应该接受检查?

性生活频繁的人或出现上述症状者，建议就医详查。

如何诊断淋病?

- 棉签样本 - 以棉花签在患处采集细胞样本
- 尿液样本

(DSC诊所采的是细菌培养检测及聚合酶链锁反应 (PCR) 检测)

淋病感染可以治吗?

淋病感染是可以根治。一般以注射抗生素搭配口服抗生素，及时治疗即能痊愈。但随着淋病细菌的抗药性越来越强，治疗也变得棘手。

淋病是一种传染率极高的性病，患者和性伴侣双方应同时接受检查和治疗，待彻底治愈后方可恢复房事。

淋病感染会造成其它问题吗?

男士	妇女
<ul style="list-style-type: none"> • 睾丸附睾炎——睾丸附睾受淋病感染引发炎症，而肿大、疼痛 	<ul style="list-style-type: none"> • 无发受孕 • 盆腔炎 (PID) 子宫与输卵管感染造成腹痛，输卵管损伤，不孕或宫外孕 (异常)

男士和妇女

淋病毒还可以扩散到病患的血液、关节、皮肤和心脏，男女皆可发病。

怀孕期间受感染

患有淋病的孕妇在分娩时，会将病毒传染给胎儿，引起新生儿严重眼炎，甚至失明。

我需要回来复诊?

- 治疗后复诊是非常重要的，这能然医生检定您是否已完全治愈。
- 淋病患者治疗后，应当在14后复诊。
- 在复诊当天，治疗后的患者会再一次进行检测以确保完全治愈。
- 本诊所也会帮患者安排预约在3个月后进行梅毒及爱之病检测。
- 若患者没依照诊所安排的预约日期回来复诊，本诊所会通过电话或信件的方式来联系前患者。

注意事项

- 出现淋病症状时，请即刻求医诊治。
- 男性患者在求医前至少4小时内请勿排尿，方能使检测结果更准确。
- 在医生判定已经治愈之前，请勿进行性行为。
- 切勿自行服药，这将会压制任何症状。
- 如有任何药物过敏，请您通知医生。
- 尽早通知性伴侣接受检查、及时治疗。
- 因为淋病是没有任何永久性的免疫所以重复感染淋病的可能性是可以发生，建议您定期的进行检测。

进行较安全性行为

- 进行无体液（阴道分泌或精液）交流的性行为。
- 每次进行性行为都正确的使用安全套。
- 避免在进行性行为前/时过量饮酒，因为这将影响您的判断力。

免责声明

根据目前的医学证据与意见，我们试图在病人治疗册上提共最全面及最正确与最新的新的信息。然而，不同的资料来源与随着时间的推移，信息与意见可能有所不同。您若有任何问题，请咨询您的医生或医疗人员。