


## 地点



### DSC 诊所

31 Kelantan Lane #01-16 S(200031)

### 巴士服务

23, 64, 65, 66, 67, 130, 139, 147, 857

### 最靠近的地铁站

- 武吉士 (东西线/市区线)
- 梧槽 (市区线)
- 花拉公园 (东北线)
- 劳明达 (东西线)

爱之病/性病录音资讯线  
6295 2944

爱之病/性病热线  
1800 - 2521324 (办公时间)

## 与我们预约

请拨打  
6293 9648 预约中心  
或电邮至  
apptdsc@nsc.com.sg 预约

更多诊所资料请查阅网址 [WWW.DSC-CLINIC.SG](http://WWW.DSC-CLINIC.SG)  
或上我们的脸书 [WWW.FACEBOOK.COM/DSCSG](http://WWW.FACEBOOK.COM/DSCSG)



触染性软疣

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM



NATIONAL SKIN CENTRE

DSC Clinic

## 什么是传染性软疣？

传染性软疣是由 Molluscum contagiosum（传染性软疣）病毒引发的一种皮肤感染。

## 传染性软疣如何传播？

可通过性或非性皮肤接触从受感染者传播至他人。

性传播往往导致软疣出现在性区附近的皮肤上，而非性传播通常导致病变出现在面部、手臂和躯干上。

有时，感染可通过浴巾、海绵等物品以及造成皮肤切口的物品（如剃刀）传播。如果您已出现感染，则避免共用毛巾和个人卫生用品。还应避免在受影响部位进行剃须和其他脱毛程序，以防止软疣在身体上的进一步蔓延。

如果您有多名伴侣或者与性工作发生性关系，则患上软疣和其他性传播感染的可能性更高。

## 有哪些症状和体征？

- 无症状。暴露 2 周至 6 个月后，皮肤上可能会出现肉色小肿块
- 肿块可能出现在性区、大腿、臀部和耻骨区，有时出现在肛门周围
- 如果免疫力低下，则出现肿块的区域往往更加广泛
- 一些软疣患者会在肿块周围出现皮疹。

## 哪些人应接受检测？

如果出现不寻常的包块或水疱且数天内未消失，或者如果您的性伴侣出现软疣体征和症状，您可能想要接受检测。

## 如何诊断传染性软疣？

医生或护士将检查您的皮肤。他们可能会对采集自肿块中心的小样品进行检测，以确认诊断。

前往 DSC Clinic 进行访视当天获悉结果。

## 传染性软疣能否治愈？

在未进行治疗的情况下，软疣通常在 6-12 个月（长达 4 年）内消退。虽然不会引起严重的并发症，但肿块并不美观。

治疗可以加快进程，但可能造成不适并产生疤痕。

治疗类型包括：

- 冷冻治疗
- 刮除
- 各种肿块芯
- 乳膏或乳液

所有肿块消失前，可能需要重复治疗。可能再次出现新肿块。

如果 HIV 检测结果为阳性，则软疣可能更加难以治疗。

## 传染性软疣

如果您正处于妊娠期或哺乳期，则将此情况告知医生，因为这可能会影响他们为您选择的治疗。

## 我是否需要返回进行随访访视？

医生会相应地为您提供建议。您可能需要返回诊所检查是否出现其他性传播感染和 HIV，特别是如果您在过去 3 个月中有过任何无保护性行为。

## 重要的注意事项

鼓励您的性伴侣前来进行检查。您和您的伴侣可能会从针对其他性传播感染和 HIV 的检查中受益。

如果您发现任何肿块，可通过避免性行为降低传播感染的可能性。避孕套不能防止软疣传播，因为它无法覆盖所有受影响的皮肤区域。

## 免责声明

基于目前的医学证据和意见，我们尝试在此患者信息说明书中提供完整且准确的最新信息。然而，信息和建议可能会因来源不同而有所不同，而且随着时间的推移也可能发生变化。如果您有任何疑问进一步的问题，请联系您的医生或医疗保健提供者。