


## 地点



### DSC 诊所

31 Kelantan Lane #01-16 S(200031)

### 巴士服务

23, 64, 65, 66, 67, 130, 139, 147, 857

### 最靠近的地铁站

武吉士 (东西线 / 市区线)

劳明达 (东西线)

花拉公园 (东北线)

梧槽 (市区线)

惹兰勿刹 (市区线)

爱之病/性病录音资讯线

6295 2944

爱之病/性病热线

1800 - 2521324 (办公时间)

## 与我们预约

请拨打

6293 9648 预约中心

或电邮至

apptdsc@nsc.com.sg 预约

更多诊所资料请查阅网址 [WWW.DSC-CLINIC.SG](http://WWW.DSC-CLINIC.SG)  
或上我们的脸书 [WWW.FACEBOOK.COM/DSCSG](http://WWW.FACEBOOK.COM/DSCSG)

## 梅毒 SYPHILIS

## 什么是梅毒 ( Syphilis ) ?

梅毒是一种通过性行为传染，由细菌导致的感染。

### 梅毒怎么传染？

- 与梅毒感染者发生性行为（包括口交）
- 母婴传播
- 输入了受感染的血液制品
- 被污染的针头扎伤或与感染者共用静脉输液针

### 梅毒有哪些症状？

大部分患上梅毒的人都没有明显症状。

梅毒的症状按病程不同而分为以下几类。

第一期	第二期	潜伏期	晚期
生殖器长出无痛无痒的疮	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 手掌和脚底出现红疹</li> <li>• 颈部和腋下腺体肿胀</li> <li>• 阴部和肛周发疹</li> <li>• 局部脱发</li> <li>• 脑膜炎</li> </ul>	没有任何症状，但病毒可能继续侵犯全身各器官组织	身体器官（如脑部、神经、心脏及皮肤）受到永久性损害

#### 先天性梅毒

先天性梅毒指的是受感染母体在怀孕期间或生产过程中把病毒传染给胎儿，症状包括：

- 骨骼畸形
- 失明
- 耳聋
- 脸面及牙齿畸形
- 皮疹
- 产后早夭

### 症状什么时候出现？

传染性梅毒			非传染性梅毒	
第一期	第二期	潜伏期早期	潜伏期后期	晚期
感染后9-90天	感染后数周至6个月(或2年以内)	感染后1年以内	感染后超过1年	感染后5-30年

\*感染梅毒的孕妇，不管是第几期的梅毒，都可能传染给腹中的胎儿。

### 哪些人应该接受检查？

如果您怀疑自己可能受到感染或性伴侣被确诊患有梅毒，请即刻寻求医疗辅导及接受检查。

不管您是否出现有关症状，请务必把梅毒检查列为例行性体检的项目之一。

### 如何诊断梅毒？

- 梅毒可透过验血检查做出诊断，通常需要进行两种或以上血液检查来确诊。
- 或可刮取疹疮或溃烂处的渗出液进行检查，以做出诊断。
- 高危性行为后3个月左右，才能通过血液检查准确检测出梅毒感染（如同HIV检验）。
- 凡确诊为梅毒者，都应该接受HIV检查。

### 梅毒可以治愈吗？

是的，梅毒是可以治愈的。

- 患者可接受盘尼西林 (Penicillin, 即青霉素) 注射治疗。
- 患者如对盘尼西林过敏，也可使用其它抗生素治疗。

### 梅毒会引起其它并发症吗？

梅毒若不及时治疗，可能损害脑部、心脏以及身体其它器官。

### 梅毒对怀孕的影响

- 孕妇患有梅毒可能传染给腹中胎儿，而造成胎儿畸形。
- 孕妇患者应在治疗后，分娩前每月做一次梅毒验血检查，产后则继续复查。
- 新生儿出生后6个月必须接受验血检查，确认没有受到梅毒感染。

### 治愈后需要复诊吗？

患者应在治疗后每三个月，即治疗后的第3个月、6个月、12个月、18个月以及24个月后复诊检查，以确保梅毒感染已完全治愈。

### 重要提示

- 梅毒不能终生免疫，曾经患过梅毒的人治愈后仍可重复感染。
- 如有梅毒病史，请务必通知医生；梅毒患者完全治愈后，验血检查仍可能终身呈阳性反应（即所谓的“血清疤痕”）。
- 如有药物过敏，请预先通知医生。
- 在疗程结束前，应避免性生活。
- 梅毒患者请勿捐血。
- 请确保性伴侣也接受检查，以便尽早发现感染并及时治疗。

#### 采取安全性行为

- 采取无体液（如阴道液或精液）交换的性交方式。
- 每次行房时都正确使用安全套。
- 行房前或行房时不要过量饮酒，以免影响判断能力。

### 免责声明

本患者资料册以现今的医疗研究结果和建议为据，旨在提供详尽而正确的最新医疗资讯，但内容可能因资讯来源不同或随时间改变而有所差异。如有疑问，请咨询您的医生或医疗保健提供者。